

Az OH 2018/27. számában megjelent kvíz megoldásai:

1. D, 2. C, 3., A, 4. B, 5. B, 6. C, 7. D, 8. D, 9. D, 10. C

Indoklások:

1. D) A protonpumpagátlók (PPI-k) hosszú távú alkalmazásával kapcsolatban az utóbbi időszakban számos közlemény született. A felmerült lehetséges mellékhatások között a csonttörések fokozott kockázata, a csökkent B₁₂-vitamin-szint és a *Clostridium difficile*-fertőzés emelhető ki. Több munkacsoport foglalkozott a PPI-kezelés és a közösségben szerzett pneumonia közötti összefüggéssel is.
2. C) Az 5-fluorouracil és a metotrexát antimetabolit, a ciklofoszfamid és a ciszplatin alkilálószer.
3. A) A carcinosarcoma ritka, agresszív uteruscarcinoma, amely valószínűleg az uterus endometriumának epithelsejtjeiből származik. Lokalizációját tekintve a leggyakrabban az uterusban fordul elő.
4. B) Az arteria iliaca aneurysma ritka érbetegség, amely az esetek 20%-ában abdominalis aorta aneurysmával együtt jelenik meg, az izolált formában az intraabdominalis aneurysmák kevesebb mint 6–7%-a.
5. B) A tüdőrákos betegek kezelésében napjainkban még mindig a sebészeti reszekció számít az arany standardnak, amennyiben a tumor eltávolítható. A sebészeti kezelés mellett a stádiumtól függő posztoperatív kemoterápia a betegek túlélését tekintve jelentős szereppel bír. Az új tüdőrákos betegek 51%-a részesült kemoterápiában 2017-ben a Korányi Bulletin szerint.
6. C) Dilatatív cardiomyopathiára a myocardium kontraktilitásának progresszív csökkenése és következményes szívüregi dilatáció jellemző. A szívtranszplantáció fő indikációja. A betegek mintegy 50%-ánál az etiológia ismeretlen.
7. D) Az appendixdiverticulitis jellemzően az akut appendicitis tüneteit utánozza, de a tünetek fennállása hosszabb (átlagosan 4 nap).
8. D) A congenitalis vitiumok a leggyakoribb veleszületett rendellenességek. A csecsemő- és kisgyermekkorban morbiditásban és mortalitásban fontos szerepet töltenek be. A leggyakoribb a ventricularis septumdefektus.
9. D) A növényi falat alkotó anyagok összességét rostnak nevezik, amelyek egy része alkotja az élelmi rostot. Az élelmi rostot vízben oldható és oldhatatlan frakciók alkotják. A cellulóz és a lignin vízben oldhatatlan frakciók.
10. C) A preemtív analgesiára ajánlott gyógyszerek közül a paracetamol per os és iv. is alkalmazható.

Az OH-KVÍZ megfejtésével folyamatos orvos-továbbképzési pontokhoz juthat!

A Semmelweis Egyetem Továbbképző Központjának döntése értelmében az OH-KVÍZ megfejtésének beküldői folyamatos orvos-továbbképzési pontokat kapnak.

Amennyiben a jó válaszok aránya meghaladja a 60%-ot, kvízenként 2, félévente maximum 12 továbbképzési pont kapható. Távoktatással szerzett pontokból évente legfeljebb 20 pont számítható be [MK 2003/99. (VIII. 22.)].

A 100%-osan helyes választ beküldők jutalma egy, az Akadémiai Kiadó webáruházában kedvezményes vásárlásra jogosító kupon.

A megfejtések az *Orvosi Hetilap* szerkesztőségébe levelezőlapon és e-mailen küldhetők be.

A beküldött megfejtések értékelését, a helyes megfejtők nyilvántartását az *Orvosi Hetilap* szerkesztői végzik, s az adatokat továbbítják az egyetemeknek.

Ha kreditpontokat kíván gyűjteni, kérjük, adja meg pecsétszámát, szakterületét és munkahelyét is.

A helyes megoldást a következő havi feladvánnyal együtt, a nyertes nevét a következő havi második számunkban közöljük.

A megfejtések beküldési határideje: 2018. augusztus 21.

Beküldési cím: Akadémiai Kiadó Zrt., 1519 Budapest, Pf. 245, e-mail: edit.budai@akademai.hu

OH-KVÍZ – 2018/31. szám

Válassza ki az alábbi lehetőségek közül a megfelelőt!

- Mit bont a kataláz enzim?
 - Hidrogén-peroxidot.
 - Vizet.
 - Alkoholt.
 - Egyiket sem.
- Mi a jellegzetessége az autoinflammációs szindrómáknak?
 - Visszatérő láz.
 - Szisztémás gyulladásos tünetek.
 - Mindkettő.
 - Egyik sem.
- Mi a metasztatikus cervixtumor első vonalban ajánlott kezelése az Európai Onkológiai Társaság ajánlása szerint?
 - Bevacizumab.
 - Karboplatin-paklitaxel.
 - Topotekán-paklitaxel.
 - Ciszplatin-paklitaxel.
- Milyen reumatológiai manifesztációjuk lehet az autoinflammációs betegségeknek?
 - Asepticus arthritis.
 - Arthralgia.
 - Osteomyelitis.
 - Mindegyik.
- Milyen fogászati betegségek befolyásolhatják a terhesség lefolyását, szövődményeit?
 - Fogérózió.
 - Ínygyulladás.
 - Fogszuvasodás.
 - Mindegyik.
- Hány százalék a szívűtétek perioperatív időszakában fellépő alacsony perctérfogat szindróma miatti halálozás?
 - 2%.
 - 16,9%.
 - 25%.
 - 36,2%.
- Mi a vakság leggyakoribb oka az iparosodott országokban?
 - Időskori maculadegeneráció.
 - Diabeteses retinopathia.
 - Glaucoma.
 - Cataracta.
- Melyik jellemzi a Chédiak–Higashi-szindrómát?
 - Parciális oculocutan albinizmus.
 - Immundeficientia.
 - Autoszomális recesszív öröklésmenet.
 - Mindegyik jellemző.
- Mi a differenciált papillaris carcinoma kezelése?
 - Műtét.
 - Nagy dózisú radiojód-kezelés.
 - TSH-szuppresszív kezelés.
 - Mindegyik.
- Mekkora a COPD becsült prevalanciája a 40 év feletti populációban hazánkban?
 - 5%.
 - 10%.
 - 15%.
 - 20%.

A rendezvények és kongresszusok híryanagának leadása

a lap megjelenése előtt legalább 40 nappal lehetséges, a 6 hetes nyomdai átfutás miatt.
Kérjük megrendelőink szíves megértését.

A híryanagokat a következő címre kérjük:
Orvosi Hetilap titkársága: edit.budai@akademai.hu
Akadémiai Kiadó Zrt.